

# SOTYKTU®

## – din nya behandling vid måttlig till svår plackpsoriasis

Du har blivit förskrivnen läkemedlet SOTYKTU av din läkare för att minska dina besvär vid plackpsoriasis. Informationen i detta blad ersätter inte bipacksedeln eller de råd du får av din läkare. Läs bipacksedeln innan du börjar använda SOTYKTU. Har du frågor eller känner dig osäker på något, kontakta din läkare.

### Vad är SOTYKTU?

SOTYKTU är ett läkemedel som används för att behandla måttlig till svår psoriasis och innehåller den aktiva substansen deukravacitinib. Specifikt påverkar SOTYKTU ett enzym som kallas TYK2 (tyrosinkinasa 2), som är inblandat i inflammationsprocessen vid plackpsoriasis. Genom att minska aktiviteten av detta enzym kan SOTYKTU bidra till att kontrollera inflammationen. Sjukdomstecken såsom torr hud, sprickor, fjällning, hudömsning, rodnad och blödning påverkas när sjukdomssymtomen som exempelvis klåda, smärta, sveda, stickningar och hudstramhet minskas.

SOTYKTU har även visat sig förbättra livskvaliteten hos patienter med psoriasis vilket kan innebära att sjukdomens påverkan på dina dagliga aktiviteter, relationer och andra faktorer minskas.

Läs bipacksedeln som finns i förpackningen för mer information. Om du upplever biverkningar, kontakta din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.



### Hur tar jag SOTYKTU?

SOTYKTU är en tablettbehandling. Rekommenderad dos är en tablett (6 mg) en gång dagligen som kan tas med eller utan mat. Tabletterna ska sväljas hela och inte krossas, delas eller tuggas.

### Om du har tagit för stor mängd av SOTYKTU

Tala med din läkare så fort som möjligt om du har tagit mer SOTYKTU än du borde. Du kan få en del av de biverkningar som anges i bipacksedeln.

### Om du har glömt att ta SOTYKTU

Ta din vanliga dos nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

### Om du slutar att ta SOTYKTU

Sluta inte att ta SOTYKTU utan att först prata med din läkare. Om du avbryter behandlingen kan psoriasis-symtomen komma tillbaka.

## Vilka biverkningar kan jag få av SOTYKTU?

Som med alla läkemedel kan SOTYKTU orsaka biverkningar. Den vanligaste biverkningen är infektion i de övre luftvägarna som kan ge symtom såsom t ex halsont och nästäppa.

Andra biverkningar som kan uppstå är virusinfektion i munnen (såsom munsår), ökade nivåer av ett enzym i blodet som heter kreatinfosfokinas (CPK), akneliknande utslag, inflammation i hårsäckarna och bältros. I bipacksedeln framgår det tydligt hur ofta de nämnda biverkningarna förekommer.



## EN TABLETT DAGLIGEN

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

**SOTYKTU® 6 mg** filmdragerade tabletter.

Den verksamma substansen i SOTYKTU heter deukravacitinib.

### Vad SOTYKTU är och vad det används för:

SOTYKTU innehåller den aktiva substansen deukravacitinib, som tillhör en klass av läkemedel som kallas tyrosinkinas 2-hämmare (TYK2 hämmare) som minskar inflammationen i samband med psoriasis. SOTYKTU används för att behandla vuxna med måttlig till svår plackpsoriasis, vilket är ett inflammatoriskt tillstånd som påverkar huden och kan orsaka röda, fjällande, tjocka, kliande, smärtsamma fläckar på huden och även påverka hårbotten, naglar, händer och fötter.

### Använd inte SOTYKTU:

- om du är allergisk mot deukravacitinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.
- om du har en infektion, inklusive aktiv tuberkulos, som din läkare anser är betydelsefull.

### Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar SOTYKTU:

- om du för närvarande har en infektion som inte läker ut eller som ständigt återkommer.
- om du har eller någonsin har haft tuberkulos.
- om du har cancer, eftersom läkaren då måste avgöra om du ändå kan få SOTYKTU.
- om du har hjärtproblem eller något medicinskt tillstånd som ökar risken för att du ska utveckla hjärtsjukdom – det är inte klart om SOTYKTU ökar risken för hjärtsjukdom.
- om du har haft eller riskerar att få blodproppar i venerna i benen (djup ventrombos) eller lungorna (lungemboli). Tala om för läkare om ett ben svullnar och gör ont eller om du får bröstsmärta eller andnöd eftersom det kan vara tecken på blodproppar i venerna. Det är inte klart om SOTYKTU ökar risken för blodproppar.
- om du nyligen har tagit ett vaccin eller planerar att ta ett vaccin.

### Ytterligare information:

För fullständig information om SOTYKTU, läs noga igenom bipacksedeln som medföljer förpackningen (och den finns även på [www.fass.se](http://www.fass.se)).

Bristol Myers Squibb

Tel: 08 704 71 00

[www.bms.com/se](http://www.bms.com/se)

Version 2

1787-SE-2300055